

Ferme laitière à Sterpenich



Chez Jean-Marie et Vinciane Stoffel – Muller



Situation actuelle

Altitude entre 330 et 350 m sur sol très variable
(de sableux à lourd)

SAU : 73 ha

- ✓ Prairies permanentes : 42 ha
(dont seulement 6 attenant à l'étable)
- ✓ Maïs : 15 ha
- ✓ Prairies temporaires : 16 ha



✓ Production : lait (560.000 L) et Viande (28 BBB)

- ✓ Reprise (installation) avec sa sœur en 1982 avec quota de 130.000 L puis reprise totale en 1992.
- ✓ Ferme à orientation laitière, la production s'élève rapidement grâce à l'achat de quotas supplémentaires.
- ✓ Membre du CETA laitier (puis de Ecolait) et de la Cuma de Barnich.
- ✓ Sélection vers la Holstein par insémination. Tout le bétail est inscrit.



- ✓ En 2013 changement de cap et de race : Fleckvieh allemande plus rustique pour une production axée davantage sur les fourrages et pour le bien-être de l'éleveur.

« La Holstein est une F1, la Fleckvieh c'est la voiture de rallye »



- ✓ Stabulation sur caillebotis et logettes pour les laitières; libre sur paille pour BBB.
- ✓ Couloir d'alimentation central.
- ✓ Salle de traite 1*8 par l'arrière
- ✓ Mélangeuse-pailleuse distributrice et 2 DAC

Ration de base



- ✓ L'exploitation est handicapée par un grand morcellement des parcelles entre plusieurs sites fort éloignés.
⇒ Pâturage quasi impossible et zéro grazing obligé
- ✓ La ration de base, distribuée quotidiennement est établie pour 28 L.

Herbe, maïs, drèches, rumiplus, correcteur+minéral

- ✓ Le DAC est adapté après chaque contrôle laitier
- ✓ Les laitières ont accès en permanence au cornadis et à la pâture (promenade)
(2 parcelles en alternance de + ou - 3 ha.)



Extrait comptabilité AWE 2016 :

Par vache : (45% de primipares!)

- Lait total à 4% : 7.627 L
- Lait fourrage grossier : 4.912 L
- Équivalent concentré : 1.386 kg.

Gestion des fourrages



- ✓ Culture maïs ensilage et prairies temporaires en alternance (temporaires 3 à 4 ans).
- ✓ Travaux réalisés en CUMA ou par l'entreprise.
- ✓ Le choix des mélanges de graminées sont définis avec « Fourrage mieux » selon la nature du sol (analyses à Michamps) et date de semis (semis de printemps après maïs pour la plupart des cas).
- ✓ NB : Les semis de printemps se font avec couvert de pois nains => première coupe bien valorisée.



- ✓ Fumure organique : lisier (épandage sur les prairies de fauches après chaque coupe) et fumier composté (épandage sur les pâtures). Le taux de liaison au sol est de 0.80.
- ✓ Au total, les prairies de fauches temporaires ou permanentes reçoivent 62 m³ de lisier en 4 passages (après chaque coupe).
- ✓ Fumure minérale : au total 150 unités d'azote en 3 fractions selon les conditions climatiques et état de la culture après la fauche (50-70-30 en 2017)

